

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>Reifegruppe</b>   | früh, Reife 5 |
| <b>Registrierung</b> | FR 2018       |
| <b>Züchter</b>       | RAGT 2n       |

### Charakteristik

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Sortentyp         | HO-Sonnenblume  |
| Herbizidresistenz | Clearfield Plus |

### Agronomische Eigenschaften

|              |   |
|--------------|---|
| Jugend       | 7 |
| Blühbeginn   | 5 |
| Korbhaltung  | 5 |
| Wuchshöhe    | 5 |
| Lager        | 4 |
| Stängelbruch | 5 |

### Ertrags- und Qualitätsparameter

|            |   |
|------------|---|
| Kornertrag | 8 |
| TKM        | 5 |
| Ölgehalt   | 6 |

### Krankheitsanfälligkeit

|                     |   |
|---------------------|---|
| Phoma               | 5 |
| Sclerotinia Korb    | 5 |
| Sclerotinia Stängel | 4 |

### Empfohlene Aussaatstärke (Körner/m²)

6 bis 7 Körner/m²



# RGT VOLLCANO CLP

## Ideale Kombination

- frühe Reife
- High-Oleic und CLP
- rasche Jugendentwicklung

Die früh reifende „Clearfield Plus-Sorte“ **RGT VOLLCANO CLP** ist mehltolerant und überdurchschnittlich tolerant gegenüber Stängelkrankheiten wie Sklerotinia und Phoma. **RGT VOLLCANO CLP** zeigt eine sehr gute Jugendentwicklung sowie eine ausgezeichnete Standfestigkeit bei mittlerer Wuchshöhe. **RGT VOLLCANO CLP** passt perfekt in die Grenzlagen des Sonnenblumenanbaus (Waldviertel, Oberösterreich, etc.).