

RGT JACUZZI

Rilassati per le ottime rese
di questa colza

Varietà con un ottimo sviluppo autunnale

Buona resistenza alla deiscenza

Produzioni stabili ed elevate



COLZA IBRIDA INVERNALE

RGT JAKUZZI

Rilassati per le ottime rese di questa colza



Iscrizione in Danimarca nel 2017.
Tipo: ibrido.

RAGT crea la gamma di «Colza Efficiente» con varietà che hanno un contenuto più elevato in olio rispetto alle varietà commerciali standard.



NOTA sui dati della presente scheda: i dati e i valori qui menzionati, sono da intendersi in modo indicativo, sulla base dei valori/rilievi e osservazioni ottenute da prove ufficiali e/o private su più anni e in diverse località di riferimento in areali europei. Al variare delle condizioni agronomiche o climatiche, possono verificarsi comportamenti o risultati differenti. In nessun caso RAGT o chi per essa, potrà essere ritenuta responsabile di risultati diversi da quanto qui citato a titolo puramente indicativo. Fonte foto: Archivio RAGT Semences.

PROFILO AGRONOMICQ-QUALITA'

Taglia	alta
Qualità dello stelo	buona
Sviluppo autunnale	eccellente
Allungamento	medio
Contenuto in olio	elevato
Contenuto proteico	medio
Contenuto in glucosinolato	medio
PMS	medio

PROFILO VARIETALE

Precocità a maturazione	medio-precocce
Precocità a fioritura	medio-precocce
Precocità alla raccolta	medio-precocce
Resistenza allettamento	buona
Resistenza al freddo	buona

PROFILO MALATTIE

Resistenza a Phoma	poco sensibile
Resistenza a Cylindrosporiasis	medio-poco sensibile
Resistenza a Verticillium	medio-poco sensibile
Sensibilità al clomazone	/

NOTE DEL COSTITUTTORE

RGT JACUZZI è una varietà dalla produttività sicura, che si distingue soprattutto nei terreni con fertilità medio-alta dove sviluppa al meglio il suo ottimo potenziale produttivo e in olio.

CONSIGLI CULTURALI

RGT JACUZZI è una varietà che si può seminare da agosto fino a settembre (ottimale entro fine settembre).
La dose di semina consigliata è:
- da 35 a 50 semi/m²
- da 2 a 5 kg/he
- densità desiderabile: 30-40 piante/m²
- in condizioni favorevoli si raccomanda di aumentare la dose di un 10-15%

