

R·A·G·T
Breeder & seeds expert

Каталог
2027

КУКУРУДЗА | СОНЯШНИК | СОЯ

R·A·G·T
Breeder & seeds expert

RAGT — надійний партнер

Створені аграріями. Для аграріїв.

Ми — ваш надійний партнер у світі селекції та насінництва. Нас об'єднує спільна пристрасть до землі, глибоке розуміння сільського господарства та прагнення досягати більшого.

Сильна генетика. Перевірена ефективність. Впевненість у результаті.

Завдяки широкому портфелю культур, інноваційним селекційним рішенням та генетиці, що довела свою ефективність в українських умовах, ми допомагаємо аграріям розкривати потенціал кожного поля.

Ми працюємо пліч-о-пліч із вами, пропонуючи рішення для ефективної сівозміни, стабільної продуктивності та довгострокового розвитку вашого господарства.

RAGT — разом вирощуємо успіх.





КУКУРУДЗА
(10 програм)
Зернова та силосна

ОЛІЙНІ КУЛЬТУРИ
(5 програм)
Соняшник
Ріпак

БУРЯКИ ЦУКРОВІ
(5 програм)

ЗЕРНОВІ КОЛОСОВІ
(15 програм)
Пшениця м'яка
Ячмінь озимий
Ячмінь ярий
Пшениця тверда
Тритикале
Овес

СОЯ
(1 програма)

ПОКРИВНІ КУЛЬТУРИ
(8 програм)
Гірчиця
Редька
Фацелія
Ріпа
Гречка
Овес чорний

БІЛКОВІ КУЛЬТУРИ
(3 програми)
Горох
Боби кормові

ОВОЧЕВІ КУЛЬТУРИ
(5 програм)
Едамаме
Горох посівний
Квасоля кущова
Квасоля витка
Кукурудза цукрова

КОРМОВІ ТРАВИ
(17 програм)
Райграс пасовищний
Бромус
Райграс італійський
Люцерна
Райграс гібридний
Конюшина червона
Грястиця збірна
Конюшина біла
Костриця очеретяна
Костриця лучна
Вика
Тимофіївка

ГАЗОННІ ТРАВИ
(4 програми)
Райграс пасовищний
Костриця червона
Костриця очеретяна

Кукурудза

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ, ЩО...

У 2024 році ми вирішили розділити програму Stressless на дві лінійки продуктів для глибшої адаптації з метою досягнення найкращої продуктивності в кожному регіоні України!



Charles TIERSONNIER
Product Development Manager

Стійка зміна клімату є одним із найбільших глобальних викликів, з якими стикається сучасне сільське господарство. Як один із провідних європейських селекціонерів кукурудзи, RAGT прагне відігравати провідну роль у розвитку сільськогосподарських інновацій.

Для цього RAGT реалізує глобальну програму селекції кукурудзи, що охоплює 17 селекційних станцій у 5 країнах. Завдяки цій програмі створюються високопродуктивні гібриди з ФАО від 160 до 600, а також інноваційні та стійкі рішення. Селекційна робота наших команд спрямована на покращення адаптації гібридів до різних ґрунтово-кліматичних умов і підвищення їхньої стійкості до біотичних та абіотичних стресів.

З огляду на це, протягом понад 10 років RAGT розвиває в Україні мережу дореєстраційних випробувань, що охоплює понад 50 локацій щороку. Їхня мета — оцінити нашу вихідну селекційну плазму та запропонувати вам гібриди кукурудзи, найкраще адаптовані до конкретних умов вирощування в Україні.

Саме тому під час створення гібридів ми приділяємо особливу увагу адаптації до місцевих ґрунтово-кліматичних умов, стійкості до біотичних і абіотичних стресів та ефективному використанню наявних ресурсів.

У цьому каталозі представлено наш асортимент гібридів на поточний сезон, щоб допомогти вам обрати рішення, які найкраще відповідають потребам вашого господарства.

Мережа досліджень кукурудзи в Україні





stressless

100 % гібридів RAGT, що продаються на ринку України, мають маркування **Stressless**. Гібриди **Stressless H2O** є більш гнучкими, добре адаптовані до умов метеорологічних коливань і пропонують подвійну перевагу, формуючи високу врожайність як у лімітованих, так і в оптимальних умовах вирощування. Забезпечують найкраще збереження урожаю в посуху.



stressless dry

Найкраща адаптивність для вирощування в умовах посухи та недостатнього зволоження. Гібриди мають набір усіх необхідних характеристик для формування високого врожаю в надзвичайно складних умовах дефіциту вологи, поліпшену компенсаторну здатність і адаптованість до різної густоти вирощування в центральних та південних регіонах України.



stressless optimal

Найкраща адаптація до вирощування в умовах зони середнього та достатнього зволоження. Гібриди мають набір усіх необхідних характеристик для формування максимального потенціалу врожайності, пластичні до густоти посіву та високотолерантні до холоду. Найкращий вибір для Західної, Центральної та Північної України.

fortify
FEED - STIMULATE - PROTECT

Fortify — це концепція обробки насіння кукурудзи, спеціально розроблена для забезпечення рослин основними мікро- та макроелементами живлення. Ефективна формула сумісна з різними препаратами для протруювання насіння, зокрема інсектицидами та фунгіцидами.

ЯК FORTIFY МОЖЕ ВАМ ДОПОМОГТИ?


- *Підвищує схожість насіння.*
- *Стимулює розвиток кореневої системи, покращуючи поглинання води та поживних речовин.*
- *Сприяє адаптації рослин до складніших умов сівби та підвищує ефективність формування сходів.*

У підсумку Fortify сприяє формуванню здорових, добре розвинених сходів, стійкіших до біотичних та абіотичних стресів.

У результаті створюються кращі умови для вирощування та забезпечується вища врожайність.


Інноваційні рішення протягом кожної фази розвитку!






ТИПИ ГІБРИДІВ:

КЛАСИЧНИЙ




Більш типові гібриди, що дають змогу збільшувати густоту відповідно до потенціалу ваших полів. Розкривають максимальний потенціал урожайності за умови дотримання рекомендованої густоти.

КОМПЕНСАТОРНИЙ



Гібриди з високою компенсаторною здатністю, що дає багато можливостей досягати високої врожайності в різних важких умовах вирощування і бути впевненими в результаті.

ЛІНІЙНИЙ



Гібриди чудово пристосовані до збільшення густоти. Основну увагу приділено вирівняності та стабільності кожного початка під впливом різних абіотичних факторів. Навіть за високої густоти міцність стебла залишається відмінною.

Кукурудза

Гібрид	ФАО	Тип зерна	STRESSLESS	Тип	Посухостійкість, (1-9)	Вологовіддача, (1-9)	Холодостійкість, (1-9)
РЖТ АЛОЕККС	210	зубоподібний	stressless optimal	класичний	8	8	9
РЖТ АЛІККС	220	кременисто-зубоподібний	stressless dry	класичний	9	9	7
РЖТ КЕЛОККС	240	зубоподібний	stressless optimal	класичний	8	9	8
РЖТ АККСТРІД	260	зубоподібний	stressless dry	класичний	9	9	8
РЖТ ВЕЛЮККСО	280	кременисто-зубоподібний	stressless dry	лінійний	9	8	8
РЖТ ПЕТЕРККСОН	290	зубоподібний	stressless optimal	класичний	8	9	9
РЖТ МОТОРІККС	290	зубоподібний	stressless dry	компенсаторний	9	9	9
РЖТ ЛІПЕККС	290	зубоподібний	stressless dry	класичний	8	9	8
РЖТ ЕККЗАКТ	300	зубоподібний	stressless optimal	лінійний	8	8	9
РЖТ КОЛБІККС	320	зубоподібний	stressless optimal	лінійний	8	8	8
РЖТ ОККСІТОП	330	зубоподібний	stressless dry	компенсаторний	9	8	9
РЖТ ТОЛДІККС	340	зубоподібний	stressless dry	класичний	9	9	9
РЖТ ЗАНЕТІККС	340	зубоподібний	stressless dry	класичний	9	9	9
РЖТ ВОРКС	350	зубоподібний	stressless dry	компенсаторний	9	8	9
РЖТ ТЕККСІЯ	350	зубоподібний	stressless optimal	класичний	8	9	9
РЖТ ПІНККФЛОЙД	360	зубоподібний	stressless optimal	класичний	8	9	7
РЖТ ЕЛЕККС	370	зубоподібний	stressless dry	класичний	9	9	8
РЖТ ГЮККСО	430	зубоподібний	stressless dry	лінійний	9	8	9

Гібрид	Вирощування в монокультурі, (1-9)	Вирощування за мінімального обробітку ґрунту, (1-9)	Вирощування за нульового обробітку ґрунту, (1-9)	Придатність до пізнього збирання, (1-9)	Рівень мінерального живлення, (1-9)
РЖТ АЛОЕККС	9	9	9	9	9
РЖТ АЛІККС	9	9	9	9	7
РЖТ КЕЛОККС	9	9	9	9	9
РЖТ АККСТРІД	9	9	9	9	7
РЖТ ВЕЛЮККСО	8	9	8	8	7
РЖТ ПЕТЕРККСОН	8	9	8	8	9
РЖТ МОТОРІККС	9	9	9	8	7
РЖТ ЛІПЕККС	9	9	9	9	7
РЖТ ЕККЗАКТ	8	9	9	8	9
РЖТ КОЛБІККС	9	8	8	9	9
РЖТ ОККСІТОП	9	9	9	8	7
РЖТ ТОЛДІККС	9	9	9	9	8
РЖТ ЗАНЕТІККС	9	9	9	9	7
РЖТ ВОРКС	9	9	9	9	7
РЖТ ТЕККСІЯ	8	8	8	8	9
РЖТ ПІНККФЛОЙД	9	8	8	8	9
РЖТ ЕЛЕККС	9	9	9	8	7
РЖТ ГЮККСО	9	9	8	9	8



РЖТ АЛОЕККС

Додаткова інформація про гібрид та результати врожайності



stressless optimal

ВИСОКА ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ

ВИСОКОІНТЕНСИВНИЙ


МІЦНЕ СТЕБЛО ТА КОРЕНЕВА СИСТЕМА

- Унікальне поєднання зубоподібного типу зерна та раннього ФАО 210 з високим потенціалом урожайності
- Високоінтенсивний гібрид із відмінною реакцією на високий агрофон та інтенсифікацію технології вирощування
- Висока холодостійкість і добра посухостійкість у поєднанні з міцним стеблом та кореневою системою формують чудовий фундамент для повної реалізації потенціалу врожайності

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Посухостійкість	8
Вологовіддача	8
Початкові темпи росту	8
Холодостійкість	9
Стійкість до фузаріозу	9

ТИП ГІБРИДА: *КЛАСИЧНИЙ*



Максимум урожайності за оптимальної густоти

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ, (1–9):

Монокультура	9
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	9
Придатність до пізнього збирання	9
Рівень мінерального живлення	9

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕРМІНИ СІВБИ:



ранній — пізній

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА СІВБИ ТА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Зона	Придатність до зони вирощування, (1–9)	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	9	70–75 тис.
Зона середнього зволоження	9	70–75 тис.
Зона недостатнього зволоження	7	65–70 тис.
Зона посухи	5	-

РЖТ АЛІККС

Додаткова інформація про гібрид та результати врожайності



stressless dry

ВИСОКА ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

ШВИДКА ВОЛОГОВІДДАЧА


ПЛАСТИЧНИЙ ДО УМОВ ВИРОЩУВАННЯ

- Високопластичний гібрид з високою посухостійкістю рекомендований до вирощування у зонах дефіциту вологи
- Висока стійкість до вилягання та хвороб формує чудовий фундамент для вирощування у монокультурі та за різних видів обробітку ґрунту
- Високоврожайний та стабільний гібрид зі швидкою вологовіддачею

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Посухостійкість	9
Вологовіддача	9
Початкові темпи росту	8
Холодостійкість	7
Стійкість до фузаріозу	8

ТИП ГІБРИДА: *КЛАСИЧНИЙ*



Максимум урожайності за оптимальної густоти

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ, (1–9):

Монокультура	9
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	9
Придатність до пізнього збирання	9
Рівень мінерального живлення	7

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕРМІНИ СІВБИ:



ранній — пізній

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА СІВБИ ТА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Зона	Придатність до зони вирощування, (1–9)	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	7	70–75 тис.
Зона середнього зволоження	7	70–75 тис.
Зона недостатнього зволоження	9	65–70 тис.
Зона посухи	9	45–55 тис.

РЖТ КЕЛОККС

Додаткова інформація про гібрид та результати врожайності



stressless optimal

ВИСОКОІНТЕНСИВНИЙ

ШВИДКА ВОЛОГОВІДДАЧА


МІЦНЕ СТЕБЛО ТА КОРЕНЕВА СИСТЕМА

- Новітній зубоподібний гібрид ФАО 240 з інноваційною генетикою, швидкою вологовіддачею та високим потенціалом урожайності
- Високоінтенсивний гібрид зі стабільною високою врожайністю і швидким стартовим ростом, чудово адаптований до регіонів із достатнім та середнім зволоженням
- Компактний гібрид з високою толерантністю до фузаріозу, придатний до різного обробітку ґрунту та ефективного вирощування в монокультурі

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Посухостійкість	8
Вологовіддача	9
Початкові темпи росту	8
Холодостійкість	8
Стійкість до фузаріозу	8

ТИП ГІБРИДА: *КЛАСИЧНИЙ*



Максимум урожайності за оптимальної густоти

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ, (1–9):

Монокультура	9
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	9
Придатність до пізнього збирання	9
Рівень мінерального живлення	9

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕРМІНИ СІВБИ:



ранній — пізній

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА СІВБИ ТА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Зона	Придатність до зони вирощування, (1–9)	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	9	70–75 тис.
Зона середнього зволоження	9	70–75 тис.
Зона недостатнього зволоження	7	65–70 тис.
Зона посухи	5	-

РЖТ АККСТРІД

Додаткова інформація про гібрид та результати врожайності



stressless dry

ВИСОКА ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

ШВИДКА ВОЛОГОВІДДАЧА


ПЛАСТИЧНИЙ ДО УМОВ ВИРОЩУВАННЯ

- **Лідер у своїй групі ФАО серед зубоподібних гібридів завдяки високій посухостійкості та пластичності**
- **Гібрид поєднує в собі високу посухостійкість і швидку вологовіддачу, що є максимально необхідними характеристиками для умов сьогодення**
- **Надзвичайно висока адаптованість до різних технологій сівби та вирощування**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Посухостійкість	9
Вологовіддача	9
Початкові темпи росту	8
Холодостійкість	8
Стійкість до фузаріозу	9

ТИП ГІБРИДА: *КЛАСИЧНИЙ*



Максимум урожайності за оптимальної густоти

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ, (1–9):

Монокультура	9
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	9
Придатність до пізнього збирання	9
Рівень мінерального живлення	7

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕРМІНИ СІВБИ:



ранній — пізній

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА СІВБИ ТА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Зона	Придатність до зони вирощування, (1–9)	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	7	70–75 тис.
Зона середнього зволоження	7	65–70 тис.
Зона недостатнього зволоження	9	60–65 тис.
Зона посухи	9	45–55 тис.

РЖТ ВЕЛЮККСО

Додаткова інформація про гібрид та результати врожайності

stressless dry

ВИСОКА ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

ПЛАСТИЧНИЙ ДО УМОВ ВИРОЩУВАННЯ

ВИСОКА МАСА ТИСЯЧІ ЗЕРЕН




- **Найвища врожайність і стабільність у зоні посухи серед гібридів кременисто-зубоподібної групи!**
- **Надзвичайна пластичність і стабільність у поєднанні з чудовою реакцією на збільшення густоти у більшості зон зволоження гарантують досягнення максимального потенціалу врожайності**
- **Потужна архітектура врожаю сформована гнучкістю до умов вирощування та збереженням високої маси тисячі зерен у надпосушливих умовах**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Посухостійкість	9
Вологовіддача	8
Початкові темпи росту	9
Холодостійкість	8
Стійкість до фузаріозу	8

ТИП ГІБРИДА: *ЛІНІЙНИЙ*



Висока продуктивність навіть за загущення

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ, (1–9):

Монокультура	8
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	8
Придатність до пізнього збирання	8
Рівень мінерального живлення	7

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕРМІНИ СІВБИ:



ранній — пізній

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА СІВБИ ТА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Зона	Придатність до зони вирощування, (1–9)	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	7	75–80 тис.
Зона середнього зволоження	9	70–75 тис.
Зона недостатнього зволоження	9	65–70 тис.
Зона посухи	9	50–55 тис.

РЖТ ПЕТЕРККСОН

Додаткова інформація про гібрид та результати врожайності

НОВИНКА

stressless optimal

ВИСОКОІНТЕНСИВНИЙ

ШВИДКА ВОЛОГОВІДДАЧА

ПЛАСТИЧНИЙ ДО УМОВ ВИРОЩУВАННЯ




- **Високоінтенсивний гібрид з високим потенціалом урожайності та відмінною реакцією на інтенсифікацію технології**
- **Швидка вологовіддача зерна забезпечує ефективне збирання та зниження витрат на досушування**
- **Висока холодостійкість у поєднанні з доброю посухостійкістю забезпечує стабільний розвиток рослин за стресових умов вирощування**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Посухостійкість	8
Вологовіддача	9
Початкові темпи росту	8
Холодостійкість	9
Стійкість до фузаріозу	8

ТИП ГІБРИДА: *КЛАСИЧНИЙ*



Максимум урожайності за оптимальної густоти

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ, (1–9):

Монокультура	8
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	8
Придатність до пізнього збирання	8
Рівень мінерального живлення	9

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕРМІНИ СІВБИ:



ранній — пізній

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА СІВБИ ТА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Зона	Придатність до зони вирощування, (1–9)	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	9	70–75 тис.
Зона середнього зволоження	9	65–70 тис.
Зона недостатнього зволоження	9	60–65 тис.
Зона посухи	7	45–55 тис.

КУКУРУДЗА | зубоподібний

290 ФАО

Використання: *зерно*
Висота рослини: *середня*

РЖТ МОТОРІККС

Додаткова інформація про гібрид та результати врожайності

ЛІДЕР З ПРОДАЖУ

stressless dry

ВИСОКА ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

ШВИДКА ВОЛОГОВІДДАЧА

ПЛАСТИЧНИЙ ДО УМОВ ВИРОЩУВАННЯ




- Наш бестселер у зоні посухи та стандарт посухостійкості й стабільності у важких умовах сьогодення
- Швидка вологовіддача і початкові темпи росту у поєднанні з високою регулярністю початків у несприятливих умовах формують надійний фундамент реалізації потенціалу
- Дуже комфортна висота рослини, міцне стебло та коренева система гарантують ефективне вирощування за різних технологій сівби і живлення

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Посухостійкість	9
Вологовіддача	9
Початкові темпи росту	8
Холодостійкість	9
Стійкість до фузаріозу	8

ТИП ГІБРИДА: *КОМПЕНСАТОРНИЙ*



Гнучка реакція на зміну густоти

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ, (1–9):

Монокультура	8
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	9
Придатність до пізнього збирання	8
Рівень мінерального живлення	7

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕРМІНИ СІВБИ:



ранній — пізній

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА СІВБИ ТА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Зона	Придатність до зони вирощування, (1–9)	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	7	65–70 тис.
Зона середнього зволоження	9	60–70 тис.
Зона недостатнього зволоження	9	55–65 тис.
Зона посухи	9	45–55 тис.

РЖТ ЛІПЕККС

Додаткова інформація про гібрид та результати врожайності



stressless dry

ШВИДКИЙ СТАРТОВИЙ РІСТ

ШВИДКА ВОЛОГОВІДДАЧА


ПЛАСТИЧНИЙ ДО УМОВ ВИРОЩУВАННЯ

- **Гібрид, перевірений часом! Чудове поєднання стійкості до несприятливих погодних умов і пластичності до вирощування в різних ґрунтово-кліматичних умовах**
- **Стійкість до вилягання в поєднанні з високою толерантністю до фузаріозу стебла і початка є основою для відмінного результату за різних технологій сівби та вирощування**
- **Надзвичайно стабільний і високоврожайний гібрид, перевірений роками вирощування у всіх регіонах кукурудзяного поясу**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Посухостійкість	8
Вологовіддача	9
Початкові темпи росту	8
Холодостійкість	8
Стійкість до фузаріозу	9

ТИП ГІБРИДА: *КЛАСИЧНИЙ*



Максимум урожайності за оптимальної густоти

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ, (1–9):

Монокультура	9
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	9
Придатність до пізнього збирання	9
Рівень мінерального живлення	7

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕРМІНИ СІВБИ:



ранній — пізній

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА СІВБИ ТА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Зона	Придатність до зони вирощування, (1–9)	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	7	70–75 тис.
Зона середнього зволоження	8	65–70 тис.
Зона недостатнього зволоження	8	60–65 тис.
Зона посухи	7	45–55 тис.

РЖТ ЕККЗАКТ

Додаткова інформація про гібрид та результати врожайності



stressless optimal

ВИСОКА ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ

ШВИДКИЙ СТАРТОВИЙ РІСТ


ВИСОКОІНТЕНСИВНИЙ

- **Чудовий вибір у зоні достатнього та середнього зволоження з високим потенціалом урожайності та прекрасною реакцією на інтенсивну технологію вирощування**
- **Висока холодостійкість і швидкі темпи стартового росту в поєднанні з доброю посухостійкістю дають можливість повністю реалізувати потенціал урожайності**
- **Гібрид має чудову реакцію на збільшення густоти та збереження стабільності для досягнення найвищих результатів урожайності**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Посухостійкість	8
Вологовіддача	8
Початкові темпи росту	9
Холодостійкість	9
Стійкість до фузаріозу	8

ТИП ГІБРИДА: *ЛІНІЙНИЙ*



Висока продуктивність навіть за загущення

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ, (1–9):

Монокультура	8
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	9
Придатність до пізнього збирання	8
Рівень мінерального живлення	9

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕРМІНИ СІВБИ:



ранній — пізній

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА СІВБИ ТА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Зона	Придатність до зони вирощування, (1–9)	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	9	75–80 тис.
Зона середнього зволоження	9	70–75 тис.
Зона недостатнього зволоження	7	65–70 тис.
Зона посухи	5	-

РЖТ КОЛБІККС

Додаткова інформація про гібрид та результати врожайності

НОВИНКА

stressless optimal

ВИСОКОІНТЕНСИВНИЙ

ШВИДКИЙ СТАРТОВИЙ РІСТ

ПЛАСТИЧНИЙ ДО УМОВ ВИРОЩУВАННЯ




- Високоінтенсивний гібрид з високим потенціалом урожайності, що позитивно реагує на підвищення густоти стояння рослин та рівня мінерального живлення
- Потужний стартовий ріст забезпечує швидкий розвиток рослин та ефективне використання ресурсів на початкових етапах вегетації
- Висока придатність до пізнього збирання та вирощування в монокультурі забезпечує технологічну гнучкість у виробництві

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Посухостійкість	8
Вологовіддача	8
Початкові темпи росту	9
Холодостійкість	8
Стійкість до фузаріозу	9

ТИП ГІБРИДА: *ЛІНІЙНИЙ*



Висока продуктивність навіть за загущення

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ, (1–9):

Монокультура	9
Мінімальний обробіток ґрунту	8
Нульовий обробіток ґрунту	8
Придатність до пізнього збирання	9
Рівень мінерального живлення	9

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕРМІНИ СІВБИ:



ранній — пізній

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА СІВБИ ТА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Зона	Придатність до зони вирощування, (1–9)	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	9	75–80 тис.
Зона середнього зволоження	9	70–75 тис.
Зона недостатнього зволоження	7	65–70 тис.
Зона посухи	5	-

РЖТ ОККСІТОП

Додаткова інформація про гібрид та результати врожайності



stressless dry

ВИСОКА ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

ВИСОКОТОЛЕРАНТНИЙ ДО ФУЗАРІОЗУ СТЕБЛА І ПОЧАТКА


ВИСОКА ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ

- **Потужний гібрид з високою посухостійкістю та стабільністю в зоні посухи!**
- **Висока гнучкість у термінах сівби та толерантність до стресових умов забезпечують чудовий результат у посушливих умовах вирощування**
- **Висока стійкість до фузаріозу та міцність стебла в поєднанні з відмінною холодостійкістю створюють чудову адаптивність до різних технологій вирощування**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Посухостійкість	9
Вологовіддача	8
Початкові темпи росту	8
Холодостійкість	9
Стійкість до фузаріозу	9

ТИП ГІБРИДА: *КОМПЕНСАТОРНИЙ*



Гнучка реакція на зміну густоти

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ, (1–9):

Монокультура	9
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	9
Придатність до пізнього збирання	8
Рівень мінерального живлення	7

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕРМІНИ СІВБИ:



ранній — пізній

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА СІВБИ ТА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Зона	Придатність до зони вирощування, (1–9)	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	5	-
Зона середнього зволоження	7	60–70 тис.
Зона недостатнього зволоження	9	55–65 тис.
Зона посухи	9	45–55 тис.

РЖТ ТОЛДІККС

Додаткова інформація про гібрид та результати врожайності

НОВИНКА

stressless dry

ВИСОКА ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

ШВИДКА ВОЛОГОВІДДАЧА

ПЛАСТИЧНИЙ ДО УМОВ ВИРОЩУВАННЯ




- Високий та стабільний потенціал урожайності в широкому діапазоні ґрунтово-кліматичних умов вирощування
- Висока посухостійкість у поєднанні з відмінною холодостійкістю забезпечує надійність гібрида за стресових умов вирощування
- Швидка вологовіддача та висока придатність до пізнього збирання забезпечують технологічну гнучкість і оптимізують витрати на досушування зерна

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Посухостійкість	9
Вологовіддача	9
Початкові темпи росту	8
Холодостійкість	9
Стійкість до фузаріозу	9

ТИП ГІБРИДА: *КЛАСИЧНИЙ*



Максимум урожайності за оптимальної густоти

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ, (1–9):

Монокультура	9
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	9
Придатність до пізнього збирання	9
Рівень мінерального живлення	8

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕРМІНИ СІВБИ:



ранній — пізній

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА СІВБИ ТА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Зона	Придатність до зони вирощування, (1–9)	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	9	70–75 тис.
Зона середнього зволоження	9	65–70 тис.
Зона недостатнього зволоження	9	60–65 тис.
Зона посухи	9	45–55 тис.

РЖТ ЗАНЕТІККС

Додаткова інформація про гібрид та результати врожайності

ЛІДЕР З ПРОДАЖУ

stressless dry

ВИСОКА ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ

ШВИДКА ВОЛОГОВІДДАЧА

ВИСОКА ПОСУХОСТІЙКІСТЬ




- **Наш стандарт у холодостійкості та стабільності у складних умовах вирощування**
- **Висока посухостійкість дає змогу зберігати продуктивність за тривалого дефіциту вологи та високих температур**
- **Має швидку вологовіддачу та стабільно високі результати врожайності**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Посухостійкість	9
Вологовіддача	9
Початкові темпи росту	8
Холодостійкість	9
Стійкість до фузаріозу	9

ТИП ГІБРИДА: *КЛАСИЧНИЙ*



Максимум урожайності за оптимальної густоти

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ, (1–9):

Монокультура	9
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	9
Придатність до пізнього збирання	9
Рівень мінерального живлення	7

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕРМІНИ СІВБИ:



ранній — пізній

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА СІВБИ ТА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Зона	Придатність до зони вирощування, (1–9)	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	7	70–75 тис.
Зона середнього зволоження	9	65–70 тис.
Зона недостатнього зволоження	9	60–65 тис.
Зона посухи	9	45–55 тис.

РЖТ ВОРКС

Додаткова інформація про гібрид та результати врожайності

НОВИНКА

stressless dry

ВИСОКА ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

ШВИДКИЙ СТАРТОВИЙ РІСТ

ВИСОКА ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ




- Високий потенціал урожайності та відмінна адаптація до зон середнього, недостатнього зволоження і посухи
- Швидкий стартовий ріст у поєднанні з високою холодостійкістю забезпечує потужний розвиток рослин на початкових етапах вегетації
- Висока посухостійкість та адаптивність до мінімального і нульового обробітку ґрунту забезпечують стабільну продуктивність за ресурсоощадних технологій вирощування

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Посухостійкість	9
Вологовіддача	8
Початкові темпи росту	9
Холодостійкість	9
Стійкість до фузаріозу	9

ТИП ГІБРИДА: *КОМПЕНСАТОРНИЙ*



Гнучка реакція на зміну густоти

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ, (1–9):

Монокультура	9
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	9
Придатність до пізнього збирання	9
Рівень мінерального живлення	7

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕРМІНИ СІВБИ:



ранній — пізній

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА СІВБИ ТА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Зона	Придатність до зони вирощування, (1–9)	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	7	65–75 тис.
Зона середнього зволоження	9	60–70 тис.
Зона недостатнього зволоження	9	55–65 тис.
Зона посухи	9	45–55 тис.

РЖТ ТЕККСІЯ

Додаткова інформація про гібрид та результати врожайності



stressless optimal

ВИСОКА ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ

ШВИДКИЙ СТАРТОВИЙ РІСТ


ШВИДКА ВОЛОГОВІДДАЧА

- **Чудове поєднання інтенсивності та швидкої вологовіддачі для забезпечення високого результату**
- **Висока холодостійкість і швидкі темпи стартового росту в поєднанні з доброю посухостійкістю дають можливість повністю реалізувати потенціал урожайності**
- **Поєднує в собі всі агрономічні характеристики для відкриття нових можливостей ваших полів!**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Посухостійкість	8
Вологовіддача	9
Початкові темпи росту	9
Холодостійкість	9
Стійкість до фузаріозу	8

ТИП ГІБРИДА: *КЛАСИЧНИЙ*



Максимум урожайності за оптимальної густоти

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ, (1–9):

Монокультура	8
Мінімальний обробіток ґрунту	8
Нульовий обробіток ґрунту	8
Придатність до пізнього збирання	8
Рівень мінерального живлення	9

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕРМІНИ СІВБИ:



ранній — пізній

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА СІВБИ ТА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Зона	Придатність до зони вирощування, (1–9)	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	9	70–75 тис.
Зона середнього зволоження	9	65–70 тис.
Зона недостатнього зволоження	9	60–65 тис.
Зона посухи	7	45–55 тис.

РЖТ ПІНККФЛОЙД

Додаткова інформація про гібрид та результати врожайності

НОВИНКА

stressless optimal

ВИСОКОІНТЕНСИВНИЙ

ШВИДКА ВОЛОГОВІДДАЧА

ШВИДКИЙ СТАРТОВИЙ РІСТ




- Високоінтенсивний гібрид з високим потенціалом урожайності та відмінною реакцією на підвищений рівень мінерального живлення
- Швидкі темпи стартового росту забезпечують потужний розвиток рослин та ефективне використання ресурсів протягом вегетації
- Швидка вологовіддача зерна забезпечує оптимальну збиральну вологість та сприяє зниженню витрат на досушування

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Посухостійкість	8
Вологовіддача	9
Початкові темпи росту	9
Холодостійкість	7
Стійкість до фузаріозу	9

ТИП ГІБРИДА: *КЛАСИЧНИЙ*



Максимум урожайності за оптимальної густоти

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ, (1–9):

Монокультура	9
Мінімальний обробіток ґрунту	8
Нульовий обробіток ґрунту	8
Придатність до пізнього збирання	8
Рівень мінерального живлення	9

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕРМІНИ СІВБИ:



ранній — пізній

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА СІВБИ ТА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Зона	Придатність до зони вирощування, (1–9)	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	9	70–75 тис.
Зона середнього зволоження	9	65–70 тис.
Зона недостатнього зволоження	9	60–65 тис.
Зона посухи	7	45–55 тис.

РЖТ ЕЛЕККС

Додаткова інформація про гібрид та результати врожайності



stressless dry

ВИСОКА ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

ШВИДКИЙ СТАРТОВИЙ РІСТ


ШВИДКА ВОЛОГОВІДДАЧА

- **Високий потенціал урожайності з відмінною здатністю формувати продуктивність за обмеженого вологозабезпечення**
- **Швидкий стартовий ріст у поєднанні з високою стійкістю до стресових умов посухи!**
- **Чудова адаптованість до різних технологій вирощування в поєднанні з високою вологовіддачею забезпечує відмінний результат за різних умов вирощування**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Посухостійкість	9
Вологовіддача	9
Початкові темпи росту	9
Холодостійкість	8
Стійкість до фузаріозу	9

ТИП ГІБРИДА: *КЛАСИЧНИЙ*



Максимум урожайності за оптимальної густоти

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ, (1–9):

Монокультура	9
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	9
Придатність до пізнього збирання	8
Рівень мінерального живлення	7

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕРМІНИ СІВБИ:



ранній — пізній

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА СІВБИ ТА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Зона	Придатність до зони вирощування, (1–9)	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	7	70–75 тис.
Зона середнього зволоження	9	65–70 тис.
Зона недостатнього зволоження	9	60–65 тис.
Зона посухи	9	45–55 тис.

РЖТ ГЮККСО

Додаткова інформація про гібрид та результати врожайності



stressless dry

ВИСОКА ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

МІЦНЕ СТЕБЛО ТА КОРЕНЕВА СИСТЕМА


ПЛАСТИЧНИЙ ДО УМОВ ВИРОЩУВАННЯ

- **Високий потенціал урожайності та потужна архітектура рослини для максимальної продуктивності в умовах тривалої вегетації**
- **Надзвичайно потужний гібрид з високою стійкістю до стресових умов вирощування у різних регіонах, рекомендований для вирощування на зрошенні!**
- **Висока посухостійкість у поєднанні з міцним стеблом та кореневою системою формує потужний фундамент для відмінного результату за різних умов вирощування**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Посухостійкість	9
Вологовіддача	8
Початкові темпи росту	9
Холодостійкість	9
Стійкість до фузаріозу	9

ТИП ГІБРИДА: *ЛІНІЙНИЙ*



Висока продуктивність навіть за загущення

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ, (1–9):

Монокультура	9
Мінімальний обробіток ґрунту	9
Нульовий обробіток ґрунту	8
Придатність до пізнього збирання	9
Рівень мінерального живлення	8

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕРМІНИ СІВБИ:



ранній — пізній

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА СІВБИ ТА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

Зона	Придатність до зони вирощування, (1–9)	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	9	65–70 тис.
Зона середнього зволоження	9	60–65 тис.
Зона недостатнього зволоження	9	55–60 тис.
Зона посухи	9	45–55 (*85–95) тис.

*для зрошення



ГЕНЕТИКА СОНЯШНИКУ RAGT: ЕТАЛОН ВМІСТУ ОЛІЇ



Ігор ЛЕВКОВСЬКИЙ
Керівник департаменту розвитку та інновацій

Олійність насіння соняшнику є генетично зумовленою ознакою, реалізація якої залежить від умов вирощування, фізіологічного стану рослин та ефективності накопичення олії в період наливу насіння.

Селекційні програми RAGT спрямовані на створення гібридів із високим потенціалом урожайності та олійності понад 56% у перерахунку на суху речовину.

Завдяки багаторічному досвіду селекції та ретельному добору генетичного матеріалу сучасний портфель соняшнику RAGT поєднує високу врожайність, підвищену олійність і стабільність результатів за різних умов вирощування.

+2,2 бала вмісту олії (+5 %)



Генетика соняшнику RAGT забезпечує в середньому на **2,2 бала вищий вміст олії** порівняно з конкурентними гібридами. Наш гібрид РЖТ ВОЛЛЬФ, позначений символом «Дуже високий вміст олії», має **вміст олії на 5% вище** за комерційний стандарт.

Джерело: база даних RAGT, середні показники з 943 порівнянь між гібридами RAGT / Конкурентами

ІННОВАЦІЇ RAGT

oil plus

Гібриди соняшнику з високим вмістом олії — у середньому на 5% вище за комерційний стандарт.

vigor plus

Гібриди Vigor Plus мають дуже швидкий початковий ріст, високу рівномірність розвитку рослин (швидко змикають міжряддя) та високу адаптивність до різних ґрунтово-кліматичних умов.

genecare

GeneCare Orobanche — маркування гібридів соняшнику RAGT із високим рівнем стійкості до вовчка.

Маркування GeneCare ідентифікує гібриди з пірамідою генів і кількома механізмами стійкості, що забезпечують надійний захист і дають змогу охопити ширший спектр рас вовчка.

Три основні механізми стійкості:

- Перший механізм — вовчок не розпізнає соняшник і не починає проростати.
- Другий механізм — вовчок не може прикріпитися до кореня соняшнику.
- Третій механізм — відмирання туберкула внаслідок накопичення хімічних компонентів, токсичних для вовчка.

Піраміdальна стратегія забезпечує надійність захисту та зменшує ризик появи рас вовчка, здатних долати всі гени стійкості.

Express™SX®
optimized for FMC Express herbicide

Гібриди соняшнику, призначені для вирощування із застосуванням гербіциду Express® компанії FMC.

Clearfield® Plus
Production System

Гібриди виробничої системи Clearfield® Plus толерантні до гербіциду Євро-Лайтнінг® Плюс.

Гібриди селекції RAGT кваліфіковані компанією BASF як толерантні до гербіциду для соняшнику Clearfield® Plus. Це дає змогу ефективно вирішувати проблему боротьби з вовчком і бур'янами.

Чому започатковано дослідницьку програму в Україні?

- Підвищити толерантність гібридів до дефіциту вологи та стійкість до високих температур.
- Використати інноваційні джерела стійкості до вовчка.
- Створити гібриди, стійкі до специфічних хвороб, наприклад іржі.

Соняшник

Гібрид	Гербіцидний захист	Група стиглості	Тип використання	Стійкість до вовчка	Вміст олії	Висота рослини
РЖТ ВОЛЛЬФ	Класичний	Ранньостиглий	Лінолевий	A-F	54-56%	Нижча за середню
РЖТ ФІЛЛАДЕЛЬФІЯ	Класичний	Середньоранній	Лінолевий	A-G	52-54%	Нижча за середню
РЖТ БАРСЕЛЛОНА	Класичний	Середньоранній	Лінолевий	A-G	54-56%	Середня
РЖТ ВОЛЛТЕР СУ	Express™SX® optimized for FMC Express herbicide	Ранньостиглий	Лінолевий	A-G	52-56%	Вища за середню
РЖТ ГАЛЛАКСІ СУ	Express™SX® optimized for FMC Express herbicide	Середньоранній	Лінолевий	A-G	52-56%	Середня
РЖТ БУРРМА КЛП	Clearfield® Plus Production System	Середньостиглий	Високоолеїновий	A-F	52-54%	Вища за середню
РЖТ ВАЛЛЕНСІЯ КЛП	Clearfield® Plus Production System	Середньостиглий	Лінолевий	A-F	52-54%	Середня

РЖТ ВОЛЛЬФ

Додаткова інформація про гібрид та результати врожайності

ЛІДЕР З ПРОДАЖУ

oil plus

ВИСОКА ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

ДУЖЕ ВИСОКИЙ ВМІСТ ОЛІЇ

ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ



- Лідер у ранньостиглій групі! Дуже високий вміст олії в поєднанні з найвищим урожаєм поліпшує економічний результат за традиційної технології
- Наш стандарт у стійкості до вилягання, пластичності до умов вирощування та стабільності розкриття потенціалу
- Компактні розміри, висока посухостійкість і стійкість до вовчка рас A-F формують надійний фундамент для вирощування у більшості регіонів України

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Початкові темпи росту	8
Посухостійкість	8
Стійкість до вилягання	9

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ, (1–9):

Фомопсис	8
Фомоз	7
Іржа	8
Біла гниль кошика	8
Несправжня борошниста роса	7

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	60–65 тис.
Зона середнього зволоження	55–60 тис.
Зона недостатнього зволоження	50–55 тис.
Зона посухи	45–50 тис.
Зона критичної посухи	-

ВМІСТ ОЛІЇ: ДУЖЕ ВИСОКИЙ

54-56%

48–50% | 50–52% | 52–54% | **54–56%**

СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА:

A-F



СОНЯШНИК | Класичний

Середньоранній

Тип: *лінолевий*
Висота рослини: *нижча за середню*

РЖТ ФІЛЛАДЕЛЬФІЯ

Додаткова інформація про гібрид та результати врожайності

СТІЙКИЙ ДО НОВИХ РАС НЕСПРАВЖНЬОЇ БОРОШНИСТОЇ РОСИ

СТІЙКИЙ ДО РАС ВОВЧКА A–G

ВИСОКА ПОСУХОСТІЙКІСТЬ



- Поєднання високого потенціалу врожайності та олійності 52–54 % робить гібрид потужним рішенням у середньоранній групі
- Компактні розміри, стійкість до вилягання та висока толерантність до хвороб стебла забезпечують досягнення відмінного результату в будь-яких умовах
- Стійкість до несправжньої борошнистої роси, висока посухостійкість і стійкість до вовчка рас A-G гарантують відмінну врожайність у зоні недостатнього зволоження та посухи!

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Початкові темпи росту	8
Посухостійкість	9
Стійкість до вилягання	9

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ, (1–9):

Фомопсис	8
Фомоз	8
Іржа	8
Біла гниль кошика	8
Несправжня борошниста роса	9

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	-
Зона середнього зволоження	55–60 тис.
Зона недостатнього зволоження	50–55 тис.
Зона посухи	45–50 тис.
Зона критичної посухи	40–45 тис.

ВМІСТ ОЛІЇ: ВИСОКИЙ

52–54%

48–50%	50–52%	52–54%	54–56%

СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА:

A-G



РЖТ БАРСЕЛЛОНА

Додаткова інформація про гібрид та результати врожайності

genecare oil plus ORO

ВИСОКОТОЛЕРАНТНИЙ ДО ФОМОПСИСУ ТА ІРЖІ

СТІЙКИЙ ДО РАС ВОВЧКА A–G

ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ



- Гібрид характеризується комплексною толерантністю до фомопсису та іржі, а також стійкістю до вилягання, що забезпечує стабільну продуктивність у несприятливих умовах вирощування
- Дуже високий вміст олії та поєднання середньоранньої групи стиглості з великим потенціалом урожайності гарантують найвищий результат у зоні достатнього та недостатнього зволоження
- Найефективніша пірамідальна стійкість до вовчка GeneCare Orobanche, яка поєднує три механізми стійкості, що формують надійний захист вашого врожаю

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Початкові темпи росту	8
Посухостійкість	8
Стійкість до вилягання	9

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ, (1–9):

Фомопсис	8
Фомоз	7
Іржа	8
Біла гниль кошика	8
Несправжня борошниста роса	7

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	60–65 тис.
Зона середнього зволоження	55–60 тис.
Зона недостатнього зволоження	50–55 тис.
Зона посухи	-
Зона критичної посухи	-

ВМІСТ ОЛІЇ: ДУЖЕ ВИСОКИЙ

54-56%

48–50% | 50–52% | 52–54% | 54–56%

СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА:

A-G



РЖТ ВОЛЛТЕР СУ

Додаткова інформація про гібрид та результати врожайності

ЛІДЕР З ПРОДАЖУ

vigor plus oil plus

СТІЙКИЙ ДО НОВИХ РАС НЕСПРАВЖНЬОЇ БОРОШНИСТОЇ РОСИ

ВИСОКА ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

СТІЙКИЙ ДО РАС ВОВЧКА A–G



- Наш бестселер у системі гербіцидного захисту Express SX з надзвичайно важливими характеристиками для розкриття повного потенціалу врожайності
- Висока посухостійкість, стійкість до вовчка рас A-G та швидкі темпи росту на початку вегетації забезпечують максимальну адаптованість до вирощування в умовах посухи
- Стійкість до нових рас несправжньої борошнистої роси та високотолерантність до фомопсису і білої гнилі кошика допомагають досягати найвищих результатів у всіх зонах вирощування

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Початкові темпи росту	9
Посухостійкість	9
Стійкість до вилягання	7

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ, (1–9):

Фомопсис	8
Фомоз	7
Іржа	7
Біла гниль кошика	8
Несправжня борошниста роса	9

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	55–60 тис.
Зона середнього зволоження	55–60 тис.
Зона недостатнього зволоження	50–55 тис.
Зона посухи	45–50 тис.
Зона критичної посухи	40–45 тис.

ВМІСТ ОЛІЇ: ДУЖЕ ВИСОКИЙ

52-56%

48–50% | 50–52% | 52–54% | 54–56%

СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА:

A-G



РЖТ ГАЛЛАКСІ СУ

Додаткова інформація про гібрид та результати врожайності

genecare ORO vigor plus oil plus

СТІЙКИЙ ДО НОВИХ РАС НЕСПРАВЖНЬОЇ БОРОШНИСТОЇ РОСИ

ВИСОКА ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

СТІЙКИЙ ДО РАС ВОВЧКА А–G



- **Новинка в системі гербіцидного захисту Express SX поєднує пірамідальну стійкість GeneCare Orobanche з надійною стійкістю до нових рас несправжньої борошнистої роси**
- **Висока посухостійкість і адаптивність до різних зон вирощування формують надійний фундамент для реалізації повного потенціалу врожайності на вашому полі**
- **Високий вміст олії забезпечує економічну ефективність гібрида, а толерантність до хвороб сприяє формуванню стабільно високого врожаю**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Початкові темпи росту	9
Посухостійкість	9
Стійкість до вилягання	8

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ, (1–9):

Фомопсис	7
Фомоз	8
Іржа	7
Біла гниль кошика	8
Несправжня борошниста роса	9

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	60–65 тис.
Зона середнього зволоження	55–60 тис.
Зона недостатнього зволоження	50–55 тис.
Зона посухи	45–50 тис.
Зона критичної посухи	40–45 тис.

ВМІСТ ОЛІЇ: ДУЖЕ ВИСОКИЙ

52–56%

48–50% | 50–52% | 52–54% | 54–56%

СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА:

A–G



РЖТ БУРРМА КЛП

Додаткова інформація про гібрид та результати врожайності


НОВИНКА

oil plus

СТІЙКИЙ ДО НОВИХ РАС НЕСПРАВЖНЬОЇ БОРОШНИСТОЇ РОСИ

ДУЖЕ ВИСОКИЙ ВМІСТ ОЛІЇ

ВИСОКОТОЛЕРАНТНИЙ ДО ФОМОПСИСУ



- **Новий високоолеїновий гібрид у системі Clearfield Plus, що поєднує високий потенціал урожайності з відмінною якістю олії**
- **Широка адаптивність до умов вирощування дає змогу стабільно реалізовувати потенціал від зон достатнього зволоження до критичної посухи**
- **Збалансований агрономічний профіль у поєднанні з високоолеїновим типом забезпечує стабільне формування врожаю з високими якісними показниками**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Початкові темпи росту	8
Посухостійкість	8
Стійкість до вилягання	8

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ, (1–9):

Фомопсис	8
Фомоз	8
Іржа	7
Біла гниль кошика	7
Несправжня борошниста роса	9

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	55–60 тис.
Зона середнього зволоження	55–60 тис.
Зона недостатнього зволоження	50–55 тис.
Зона посухи	45–50 тис.
Зона критичної посухи	40–45 тис.

ВМІСТ ОЛІЇ: ВИСОКИЙ

52–54%

50–52% | 52–54% | 54–56%

ВМІСТ ОЛЕЇНОВОЇ КИСЛОТИ:

88–92%

86–88% | 88–90% | 90–92%

СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА:

A-F



РЖТ ВАЛЛЕНСІЯ КЛП

Додаткова інформація про гібрид та результати врожайності



СТІЙКИЙ ДО НОВИХ РАС НЕСПРАВЖНЬОЇ БОРОШНИСТОЇ РОСИ

ВИСОКОТОЛЕРАНТНИЙ ДО ФОМОПСИСУ ТА ІРЖІ

ВИСОКА ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

- **Потужне підсилення у системі гербіцидного захисту Clearfield Plus зі стійкістю до вовчка рас A-F та високою посухостійкістю, що є міцним фундаментом для розкриття усього потенціалу в зоні посухи**
- **Висока толерантність до більшості хвороб, зокрема до фомопсису, іржі та нових рас несправжньої борошнистої роси, забезпечує не тільки чудову врожайність, а й високу олійність**
- **Висока стабільність і пластичність у зоні недостатнього зволоження та посухи**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Початкові темпи росту	8
Посухостійкість	8
Стійкість до вилягання	8

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ, (1–9):

Фомопсис	9
Фомоз	8
Іржа	8
Біла гниль кошика	8
Несправжня борошниста роса	9

РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ:

	Густота рослин/га на момент збирання
Зона достатнього зволоження	-
Зона середнього зволоження	55–60 тис.
Зона недостатнього зволоження	50–55 тис.
Зона посухи	45–50 тис.
Зона критичної посухи	-

ВМІСТ ОЛІЇ: ВИСОКИЙ

52-54%

48–50% | 50–52% | 52–54% | 54–56%

СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА:

A-F

З рішеннями RAGT ви обираєте сорти сої, що забезпечують оптимальний баланс між урожайністю та вмістом протеїну!

50 років селекції

100 % сортів без ГМО

1000 нових ліній випробовують щороку

10 000 дослідних ділянок

Селекція RAGT — генетика для стабільного результату в різних умовах



Олександр ОЛЕФІРЕНКО
Менеджер з розвитку проєктів зернових та зернобобових культур

Ми в RAGT Україна пишаємося тим, що можемо запропонувати українським аграріям високопродуктивні сорти сої, створені з урахуванням місцевих умов вирощування. Спираючись на 50-річний досвід селекції сої RAGT та широкий асортимент сортів із різними групами стиглості, ми прагнемо забезпечити українських виробників надійними рішеннями для отримання стабільних урожаїв.

РІЗНОМАНІТНІСТЬ УМОВ

Наша гермоплазма створена у Франції в різних кліматичних зонах, тому сорти RAGT добре адаптовані до різних типів ґрунтів — від чорноземів до піщаних ґрунтів.

ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Наша гермоплазма забезпечує високу врожайність і сприяє підвищенню світових показників урожайності.

ВІДМІННИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Ми гарантуємо повну відсутність ГМО на всіх етапах селекції та виробництва насіння сої й пропонуємо сорти з високим вмістом протеїну.


КОМПЛЕКСНА СТІЙКІСТЬ

Стійкість до вилягання та толерантність до хвороб, особливо до склеротиніозу, — важливі характеристики, на які RAGT звертає особливу увагу під час створення сортів сої, щоб пропонувати аграріям ефективні рішення.

СЕЛЕКЦІЙНА ПРОГРАМА СОЇ

- **5 груп стиглості: 0000, 000, 00, 0, I (II)**
- **Широке портфоліо сортів для всієї Європи**
- **Понад 30 зареєстрованих сортів за 10 років**

ПРОЦЕС ВІДБОРУ СОРТІВ





Amandine GRAS
Soybean breeder

Генетичний прогрес у селекції сої дуже високий: щороку з'являються нові, продуктивніші сорти. Соя вже понад 50 років залишається одним із пріоритетних напрямів селекції RAGT. Завдяки багаторічному досвіду та використанню сучасних селекційних інструментів компанії вдалося досягти оптимального балансу між урожайністю та вмістом протеїну.
RAGT також має інноваційний відділ фітопатологічної експертизи, який працює над створенням ефективних рішень для підвищення толерантності сортів сої до основних хвороб, зокрема склеротиніозу.

Соя

Сорт	Група стиглості	Кількість CHU	Вегетаційний період, днів	Тип росту	Маса тисячі насінин	Вміст протеїну	Вміст олії	Висота рослини	Висота кріплення нижнього боба	Стійкість до вилягання, (1-9)	Стійкість до розтріскування, (1-9)
РЖТ СІГМА	Ультраранні (0000)	2300	90–105	індетермінантний	180–200 г	40–42 %	20–21 %	середня	11–12 см	8	8
РЖТ СІРЕЛІЯ	Ранньостигла (000)	2350	95–105	індетермінантний	200–220 г	40–42 %	22–23 %	середня	10–11 см	8	9
РЖТ СФІНКСА	Ранньостигла (000)	2400	100–105	напівдетермінантний	200–220 г	43–45 %	20–21 %	нижча за середню	11–12 см	9	9
РЖТ САТЕЛІЯ	Ранньостигла (000)	2450	105–110	напівдетермінантний	200–220 г	42–44 %	21–22 %	середня	11–12 см	9	9
РЖТ СУЗА	Середньоранні (00)	2550	110–115	напівдетермінантний	190–210 г	42–44 %	20–21 %	середня	12–13 см	9	9



Ультрарання (0000) | **CHU:** 2300 **ДНІВ:** 90–105

РЖТ СІГМА

Додаткова інформація про сорт та результати врожайності

НАЙРАНІШЕ ЗБИРАННЯ

ВИСОКА ПЛАСТИЧНІСТЬ ДО УМОВ ВИРОЩУВАННЯ

ЧУДОВИЙ БАЛАНС УРОЖАЙ/ПРОТЕЇН



- **Найраніший індетермінантний сорт у портфоліо, який розташований у кінці ультраранньої групи 0000**
- **Сорт має найнижчу чутливість у портфоліо до основних діючих речовин ґрунтової системи захисту від бур'янів (метрибузин, пендиметалін, метобромурон)**
- **Висока пластичність до умов вирощування у поєднанні з чудовим балансом між високою врожайністю та доброю якістю у своїй групі стиглості**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Стійкість до вилягання	8
Стійкість до розтріскування	8

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ, (1–9):

Склеротиніоз	7

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

180–200 г	40–42 %	20–21 %
Маса 1000 насінин	Вміст протеїну	Вміст олії

Тип росту:	індетермінантний
Висота рослини:	середня
Висота кріплення нижнього боба:	11–12 см
Колір квітки:	фіолетовий
Колір опушення:	коричневий
Насіннєвий рубчик:	темно-коричневого кольору

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА СІВБИ:



650 тис. сх.н./га

ЧУТЛИВІСТЬ ДО ДІЮЧИХ РЕЧОВИН*, (1–9):

Метрибузин	1
Пендиметалін	1
Метобромурон	1

* 1 – нечутлива; 9 – дуже чутлива

Ранньостигла (000) | **СНU:** 2350 **ДНІВ:** 95–105

РЖТ СІРЕЛІЯ

Додаткова інформація про сорт та результати врожайності

ЛІДЕР З ПРОДАЖУ

ВИСОКА ПЛАСТИЧНІСТЬ ДО УМОВ ВИРОЩУВАННЯ

ВИСОКИЙ ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЮ

НАЙРАНІШЕ ЗБИРАННЯ



- Сорт розташований на початку ранньостиглої групи 000 та має рекордну врожайність!
- Найкращий попередник для озимої групи! Надзвичайно пластичний до умов вирощування зі стабільно високим результатом
- Чудова адаптивність та універсальність доповнюються високими якісними показниками вмісту олії!

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Стійкість до вилягання	8
Стійкість до розтріскування	9

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ, (1–9):

Склеротиніоз	8

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

200–220 г	40–42 %	22–23 %
Маса 1000 насінин	Вміст протеїну	Вміст олії

Тип росту:	індетермінантний
Висота рослини:	середня
Висота кріплення нижнього боба:	10–11 см
Колір квітки:	фіолетовий
Колір опушення:	коричневий
Насіннєвий рубчик:	чорного кольору

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА СІВБИ:



650 тис. сх.н./га

ЧУТЛИВІСТЬ ДО ДІЮЧИХ РЕЧОВИН*, (1–9):

Метрибузин	3
Пендиметалін	4
Метобромурон	1

* 1 — нечутлива; 9 — дуже чутлива

Ранньостигла (000) | **CHU:** 2400 **ДНІВ:** 100–105

РЖТ СФІНКСА

Додаткова інформація про сорт та результати врожайності

ЖОВТИЙ РУБЧИК

ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ

ВИСОКИЙ ПРОТЕЇН



- **Високоадаптивний сорт у середині ранньостиглої групи 000 з високим фокусом на переробку! Найвищий протеїн у портфоліо!**
- **Дуже ефективно поєднує в собі якісні показники та пластичність до вирощування у різних регіонах**
- **Велика маса тисячі зерен, компактні розміри, висока стійкість до вилягання разом із чудовим розміщенням у середині найпопулярнішої групи стиглості!**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Стійкість до вилягання	9
Стійкість до розтріскування	9

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ, (1–9):

Склеротиніоз	8

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

200–220 г	43–45 %	20–21 %
Маса 1000 насінин	Вміст протеїну	Вміст олії

Тип росту:	напівдетермінантний
Висота рослини:	нижча за середню
Висота кріплення нижнього боба:	11–12 см
Колір квітки:	фіолетовий
Колір опушення:	коричневий
Насіннєвий рубчик:	жовтого кольору

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА СІВБИ:



650 тис. сх.н./га

ЧУТЛИВІСТЬ ДО ДІЮЧИХ РЕЧОВИН*, (1–9):

Метрибузин	9
Пендиметалін	3
Метобромурон	5

* 1 — нечутлива; 9 — дуже чутлива

РЖТ САТЕЛІЯ

Додаткова інформація про сорт та результати врожайності

ВИСОКИЙ ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЮ

ВИСОКИЙ ПРОТЕЇН

ВИСОКИЙ ВМІСТ ОЛІЇ



- **Потужне доповнення портфоліо у кінці ранньостиглої групи 000, сорт поєднує в собі всі сильні сторони для досягнення максимального результату**
- **Найзбалансованіший період вегетації для всієї зони вирощування сої та високий потенціал урожайності формують потужний фундамент для найкращих результатів!**
- **Високий вміст протеїну та олії, а також відмінна пластичність до умов вирощування зі стабільно високою врожайністю!**

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Стійкість до вилягання	9
Стійкість до розтріскування	9

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ, (1–9):

Склеротиніоз	8

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

200–220 г	42–44 %	21–22 %
Маса 1000 насінин	Вміст протеїну	Вміст олії

Тип росту:	напівдетермінантний
Висота рослини:	середня
Висота кріплення нижнього боба:	11–12 см
Колір квітки:	фіолетовий
Колір опушення:	коричневий
Насіннєвий рубчик:	жовтого кольору

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА СІВБИ:



650 тис. сх.н./га

ЧУТЛИВІСТЬ ДО ДІЮЧИХ РЕЧОВИН*, (1–9):

Метрибузин	9
Пендиметалін	1
Метобромурон	1

* 1 — нечутлива; 9 — дуже чутлива

РЖТ СУЗА

Додаткова інформація про сорт та результати врожайності

ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ

ВИСОКИЙ ПРОТЕЇН

ВИСОКИЙ ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЮ



- Новинка на початку середньоранньої групи 00, що поєднує у собі найвищий потенціал урожайності з високим вмістом протеїну і жовтим рубчиком, а високе кріплення нижнього боба гарантує відсутність втрат!
- Високий потенціал урожайності та стабільність завдяки напівдетермінантному типу росту, що забезпечує кращу стійкість до розтріскування та вилягання
- Низька чутливість до метрибузину в поєднанні з толерантністю до хвороб гарантує гнучке вирощування та зручне комбайнування

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, (1–9):

Стійкість до вилягання	9
Стійкість до розтріскування	9

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ, (1–9):

Склеротиніоз	7

ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

190–210 г	42–44 %	20–21 %
Маса 1000 насінин	Вміст протеїну	Вміст олії

Тип росту:	напівдетермінантний
Висота рослини:	середня
Висота кріплення нижнього боба:	12–13 см
Колір квітки:	фіолетовий
Колір опушення:	коричневий
Насіннєвий рубчик:	жовтого кольору

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА СІВБИ:



550 тис. сх.н./га

ЧУТЛИВІСТЬ ДО ДІЮЧИХ РЕЧОВИН*, (1–9):

Метрибузин	1
Пендиметалін	9
Метобромурон	1

* 1 — нечутлива; 9 — дуже чутлива



R·A·G·T

Breeder & seeds expert



www.ragt.ua

ТОВ «РАЖТ Семенс-Україна»
вул. Героїв Оборони, 10А, оф. 148 03127,
Київ, Україна
тел.: +38 (044) 538 15 31

WEB YOUTUBE FACEBOOK

Наші контакти

Департамент регіонального розвитку

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕГІОН

Юрій ВОЄВОДА
Керівник Центрального регіону (Київська, Вінницька, Житомирська, Черкаська області)
моб.: +380 67 006 03 00,
e-mail: yuriy.voievoda@ragt.com

Олесь ЯБЛОЧНЮК
Регіональний менеджер у Вінницькій та Житомирській обл.
моб.: +380 67 183 52 52

Андрій СТАНІСЛАВСЬКИЙ
Регіональний менеджер у Вінницькій та Черкаській обл.
моб.: +380 98 789 31 82

Сергій ПОПОВИЧ
Регіональний менеджер у Київській, Черкаській та Полтавській обл.
моб.: +380 67 406 40 24

Едуард ГОРНІЦЬКИЙ
Регіональний менеджер у Київській обл.
моб.: +380 50 423 83 03

ПІВДЕННИЙ РЕГІОН

Ігор БУЗАНОВ
Регіональний менеджер у Кіровоградській, Одеській та Миколаївській обл.
моб.: +380 50 367 53 33

ЗАХІДНИЙ РЕГІОН

Іван ЗЕВАКО
Керівник Західного регіону (Тернопільська, Львівська, Івано-Франківська, Хмельницька, Рівненська, Волинська, Закарпатська, Чернівецька обл.)
моб.: +380 67 567 49 47, **e-mail:** ivan.zevako@ragt.com

Роман ШЕВЧУК
Регіональний менеджер у Хмельницькій, Тернопільській та Львівській обл.
моб.: +380 66 003 45 56

Андрій КУШНІР
Регіональний менеджер у Рівненській та Волинській обл.
моб.: +380 95 447 41 97

Юрій ЯСКОВЕЦЬ
Регіональний менеджер у Хмельницькій та Рівненській обл.
моб.: +380 50 314 60 99

ПІВНІЧНО-СХІДНИЙ РЕГІОН

Олександр МУЗИЧУК
Керівник Північно-Східного регіону в Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській та Дніпропетровській обл.
моб.: +380 95 840 15 47, **e-mail:** oleksandr.muzychuk@ragt.com

Ігор ДЕРЕВ'ЯНКО
Регіональний менеджер у Полтавській та Харківській обл.
моб.: +380 50 404 20 14

Едуард МІХЕЄВ
Регіональний менеджер у Полтавській та Дніпропетровській обл.
моб.: +380 50 569 29 83

Андрій КИСИЛЬЧУК
Регіональний менеджер у Чернігівській та Сумській обл.
моб.: +380 67 695 30 03

Департамент по роботі з ключовими клієнтами

Володимир МОКРІЄНКО
Керівник департаменту по роботі з ключовими клієнтами
моб.: +380 67 214 79 95, **e-mail:** volodymyr.mokriienko@ragt.com

ПІВНІЧНО-СХІДНИЙ РЕГІОН

Сергій МУСАТЕНКО
Менеджер по роботі з ключовими клієнтами
моб.: +380 95 696 04 65

ЗАХІДНИЙ РЕГІОН

Олександр ШПІНЬ
Менеджер по роботі з ключовими клієнтами
моб.: +380 67 323 72 52

Відділ розвитку продуктів

Олександр ОЛЕФІРЕНКО
Менеджер з розвитку проєктів зернових та зернобобових культур
моб.: +380 50 457 72 69, **e-mail:** oleksandr.olefirenko@ragt.com

Технічні характеристики, наведені в цьому каталозі, отримані за результатами випробувань, проведених компанією RAGT Semences. Фактичні результати можуть відрізнятися залежно від ґрунтово-кліматичних умов, технології вирощування та особливостей агротехніки. Усі наведені дані мають виключно інформаційний характер і не є договірними зобов'язаннями компанії RAGT Semences. Фото: архів RAGT Semences. 06/2026.